

Modelo de Folheto Informativo

**paracetamol + cafeína**  
comprimido  
500mg + 65mg

Laboratório Greenpharma Química e  
Farmacêutica Ltda

## MODELO DE FOLHETO INFORMATIVO

Este folheto informativo é continuamente atualizado. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

**paracetamol + cafeína**

**Comprimido**

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

#### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimido de 500 mg de paracetamol + 65mg de cafeína, com 20 e 100 comprimidos.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

#### Cada comprimido contém:

paracetamol ..... 500 mg

cafeína ..... 65 mg

excipiente: amido, povidona, crospovidona, ácido esteárico, água.

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C à 30°C). Proteger da luz e umidade.

#### INDICAÇÃO:

Indicado para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrites e cólica menstrual.

#### POSOLOGIA:

Adultos e crianças acima de 12 anos: ingerir 1 ou 2 comprimidos a cada 4 ou 6 horas, não exceder o total de 8 comprimidos, em doses fracionadas, em um período de 24 horas.

Duração do tratamento: depende do desaparecimento dos sintomas.

**ATENÇÃO:** a dose diária total recomendada de paracetamol é de 4000mg administrados em doses fracionadas, não excedendo 1000mg/dose em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24 horas.

#### ADVERTÊNCIA:

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não use com outro produto que contenha paracetamol.

Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado.

Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

**Atenção: Este medicamento não deve ser utilizado com outros produtos contendo paracetamol. Não consumir bebidas alcoólicas.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**DIZERES LEGAIS**

MEDICAMENTO NOTIFICADO

**Notificado e produzido por:**

**GREENPHARMA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA**

VPR - 3, Quadra: 2-A, Módulos: 32/35

CEP: 75132-015

DAIA – Anápolis, GO

CNPJ: 33.408.105/0001-33

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Farm. Resp.: Eduardo Gonçalves CRF-GO 2.250

**SAC 0800 646 2288**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

**[www.greenpharma.com.br](http://www.greenpharma.com.br)**

**[greenpharma@greenpharma.com.br](mailto:greenpharma@greenpharma.com.br)**

