

Modelo de Folheto Informativo

paracetamol
solução oral
200mg/mL

Laboratório Greenpharma Química e
Farmacêutica Ltda

MODELO DE FOLHETO INFORMATIVO

Este folheto informativo é continuamente atualizado. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

paracetamol

Solução Oral

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Oral 1 e 200 frascos com 15 mL, contendo 200 mg/mL de paracetamol.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL (14 a 16 gotas) contém 200 mg de paracetamol:

paracetamol 200 mg

excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: ácido cítrico, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, aroma de tangerina, metabissulfito de sódio, macrogol e sacarina.

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C à 30°C). Proteger da luz e umidade.

INDICAÇÃO:

Uso adulto e pediátrico. Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

POSOLOGIA:

Uso pediátrico: Para crianças abaixo de 11 Kg ou 2 anos: consultar o médico antes de usar. A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/Kg/dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50 – 75 mg/Kg), em um período de 24 horas.

Uso adulto (acima de 12 anos): A dose diária máxima de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses fracionadas, não excedendo a dose de 1000 mg/dose no intervalo de 4 a 6 horas, no período de 24 horas. Duração do tratamento: depende da remissão dos sintomas.

ADVERTÊNCIA:

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. NÃO administrar este medicamento diretamente na boca do paciente.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol.

Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado.

Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE FRASCO.

Este produto contém benzoato de sódio, que pode causar reações alérgicas, como a asma, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Este medicamento contém metabissulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves, principalmente em

pacientes asmáticos.

Atenção: Este medicamento não deve ser utilizado com outros produtos contendo paracetamol. Não consumir bebidas alcoólicas.

DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO NOTIFICADO

Notificado e produzido por:

GREENPHARMA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

VPR - 3, Quadra: 2-A, Módulos: 32/35

CEP: 75132-015

DAIA – Anápolis, GO

CNPJ: 33.408.105/0001-33

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Farm. Resp.: Eduardo Gonçalves CRF-GO 2.250

SAC 0800 646 2288

Serviço de Atendimento ao Consumidor

www.greenpharma.com.br

greenpharma@greenpharma.com.br

