

Modelo de Folheto Informativo

paracetamol
comprimido
500mg e 750mg

Laboratório Greenpharma Química e
Farmacêutica Ltda

MODELO DE FOLHETO INFORMATIVO

Este folheto informativo é continuamente atualizado. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

paracetamol

Comprimido

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimido de 500 mg, com 20, 100 e 500 comprimidos.
Comprimido de 750mg, com 20, 100 e 200 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de paracetamol 500mg contém:

paracetamol500 mg
excipiente: amido, povidona, crospovidona, ácido esteárico, água.

Cada comprimido de paracetamol 750mg contém:

paracetamol750 mg
excipiente: amido, povidona, crospovidona, ácido esteárico, água

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C à 30°C). Proteger da luz e umidade.

INDICAÇÃO:

Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

POSOLOGIA:

Os comprimidos devem ser administrados por via oral, com líquido. Uso adulto (acima de 12 anos).

ATENÇÃO: A dose diária total recomendada de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses racionadas, não excedendo 1000mg/dose em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24 horas. A duração do tratamento depende da remissão dos sintomas.

ADVERTÊNCIA:

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada.

Não use com outro produto que contenha paracetamol.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado.

Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

Atenção: Este medicamento não deve ser utilizado com outros produtos contendo paracetamol. Não consumir bebidas alcoólicas.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO NOTIFICADO

Notificado e produzido por:

GREENPHARMA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

VPR - 3, Quadra: 2-A, Módulos: 32/35

CEP: 75132-015

DAIA – Anápolis, GO

CNPJ: 33.408.105/0001-33

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Farm. Resp.: Eduardo Gonçalves CRF-GO 2.250

SAC 0800 646 2288

Serviço de Atendimento ao Consumidor

www.greenpharma.com.br

greenpharma@greenpharma.com.br

